



# Afrikinių kiaulių maras

Valstybinė maisto ir  
veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius  
Tel. (8 5) 240 4361  
Nemokama telefono linija 8 800 40 403  
Faks. (8 5) 240 4362  
El. paštas vrmvt@vet.lt  
[www.vrmvt.lt](http://www.vrmvt.lt)

## KAUNO VALSTYBINĖ MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBA  
VETERINARU G. 14, BIRULIŠKIŲ KM.,  
KARMELAVOS SEN.,  
KAUNO R.

El. paštas: [info.kaunas@vymvt.lt](mailto:info.kaunas@vymvt.lt)  
Tel. (8 37) 313 516



Itarus ligą, informuoti Valstybinę  
maisto ir veterinarijos tarnybą  
visą parą veikiančia nemokama  
telefono linija  
8 800 40 403,  
tiesiogiai kreiptis į Valstybinę  
maisto ir veterinarijos tarnybos  
territoriinių padalinijų, esantį kiekviename  
rajone, arba pranešti privačiam  
veterinarijos gydytojui.

Valstybinė maisto ir  
veterinarijos tarnyba  
užtikrina gyventojus, jog  
Lietuvoje parduodama  
kiauliena yra saugi.

Afrikinis kiaulų maras  
žmonėms nepavojingas.  
Šia liga serga tik kiaulės  
ir šernai.

## Kas yra afrikinis kiaulių maras?

Afrikinis kiaulių maras yra ypač pavojinga užkrečiamoji virusinė kiaulių liga.

## Kokie klinikiniai afrikinio kiaulių maro požymiai?

Ligos inkubacinius laikotarpis trunka nuo 5 iki 15 dienų, bet gali užtęsti ir ilgiau.

Yra trys šios ligos formos: ümi, poūmė ir létinė.

**Ümi forma** – labai virulentiška, sukelianti kiaulių karščiavimą iki 40,5–42 °C, apie ausis, uodegą, pilvą, krūtinę atsirandą odos paraudimų, padažnėja krvėpavimąs. Kiauliés neéda, sutrinka jų koordinacija, gali vėmti, viduriuoti (kartais su krauju), veislinéms kiauléms pasireiškia abortų atvejų. Jos nugaišta per 6–13 dienų nuo ligos pradžios. Kiaulių mirtingumas siekia 100 proc.

**Poūmė forma** sukelia į ümia ligos formą panašius klinikinius požymius, tačiau šie yra ne taip stipriai išreištai. Pakyla kiaulių kūno temperatūra, jos beveik visą laiką guli, atsiranda reprodukcijos problemų. Kiauliés, sergančios létine afrikinio kiaulių maro forma, gali išgyventi 15–45 dienas nuo infekcijos pradžios. Kiaulių mirtingumas siekia 30–70 proc.

**Létinė forma** sukelia maziau pastebimus klinikinius požymius. Užsikretusioms kiauléms pasireiškia trumpalaikių ligos požymiai, gali pasitaikyti pagerėjimo periodų. Kiauliés netenka

svorio, jų temperatūra svyruoja, prasideda kvépavimo takų uždegimai, odos nekrozés, pasireiškia artritų.

Kiaulių ūkuose fiksuojamas 100 proc. kiaulių gaišimas.

- sustiprinama aplinkinių kiaulių fermų kontrolė; atliekami ligai imili gyvūnų klinikiniai ir laboratoriniai kraujų tyrimai;
- atliekami nušautų šernų laboratoriniai tyrimai.

## Kokia šios ligos profilaktika ir likvidavimo priemonės?

Gydymo nuo afrikinio kiaulių maro néra, sergantys šernai ar kiauliés yra naikinami.

Ūkyje atliekama dezinfekcija, ribojamas kiaulių transportavimas, stebimi aplinkiniai ūkiai.

## Kas daroma, kad virusas neišplistų į kitus kiaulių ūkius?

**Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba imasi visų būtiniausių šios ligos kontrolelės ir likvidavimo priemonių:**

- afrikinio kiaulių maro židinio vietoje nustatomas karantinas;
- siekiant apsaugoti aplinkines gyvuliuų fermas nuo galimo ligos židinio plitimo, laikina uždraudžiamas bet koks kiaulių išvezimas iš teritorijos;
- aplink ligos židinį 3 ir 10 km spinduliu nustatomos apsaugos ir priežiuros zonos, sergančios kiaulių naikinamos;
- nešerti kiaulių maisto atliekomis.

## Kaip kiaulių savininkai gali apsaugoti savo gyvulius?

Kiaulių savininkai, ištarintys, kad jų kiauliés serga, turi nedelsiant kreiptis į vietos veterinarijos gydytoją arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnus.

**Naudinga žinoti ir taikyti keletą preventinių biologinės saugos priemonių:**

- stebeti savo gyvulius, atkreipti dėmesį į neįprastus jų požymius ar elgesį;
- naujai išsigytas kiaules kurį laiką laikyti atskirai, atidžiau stebeti jų sveikatos būklę;
- kol bus nustatyta ligos priežastis, sergančias kiaules reikia atskirti nuo sveikujų;
- vengti laukinių gyvūnų kontaktu su raminiais gyvūnais;
- laikyti higienos reikalavimų, pvz.: valyti ir dezinfekuoti darbo drabužius, įranga ir transporto priemones, įvažiuojančias ir išvažiuojančias iš fermos;
- neleisti į ūkį pašaliniai asmenys, transporto priemonių;
- nešerti kiaulių maisto atliekomis.

